

REFERTO ISTOLOGICO

DESCRIZIONE DELLA LESIONE :

Neoformazione epatica disomogenea.

ORGANI FISSATI :

Fegato

SEDE ANATOMICA DEL PRELIEVO :

METODO DI PRELIEVO :

Biopsia incisionale

ASPETTO MACROSCOPICO DEL CAMPIONE :

Si riceve istocassetta contenente campioni di tessuto grigiastro.

DESCRIZIONE ISTOLOGICA :

Si esaminano campioni di tessuto epatico in cui non è riconoscibile l'architettura lobulare ed in cui non si osservano spazi portali. Gli epatociti sono irregolarmente disposti e mostrano ampie vacuolizzazioni citoplasmatiche che spingono il citoplasma residuale a ridosso della membrana plasmatica (aspetto a "cellula vegetale"), nucleo rotondo con cromatina irregolarmente addensata e nucleolo evidente e talvolta doppio. Anisocitosi ed anisocariosi appaiono moderate e non si osservano figure mitotiche nei campioni esaminati. Tra i disordinati aggregati di epatociti sono presenti spazi vascolari ripieni di globuli rossi di diametro variabile.

DIAGNOSI ISTOLOGICA :

L'estrema disarchitettura del parenchima epatico, in associazione con il dato anamnestico di lesione massa, viene ritenuta suggestiva di una neoplasia epatocellulare ben differenziata, verosimilmente di natura maligna (carcinoma epatocellulare ben differenziato). Tuttavia l'esatta differenziazione tra adenoma e carcinoma ben differenziato richiederebbe la valutazione del modello di crescita (espansivo o infiltrativo), non applicabile a biopsie incisionali.

COMMENTO :